

# AVIMAX CL50

**USO :** Premezcla reservada exclusivamente a la fabricación de alimentos para animales.

**DESCRIPCION:** Combinación sinérgica de sales cálcicas de ácidos orgánicos con aceites esenciales protegidos de alta biodisponibilidad y de manejo más confortable que le confiere una acción directa en el intestino

**ASPECTO FISICO:** Polvo grisáceo microgranulado y fluido

**COMPOSICION :**

- Butirato Cálcico feed grade
- Sales cálcicas de ácidos orgánicos
- Compuesto aromatizante
- Aceite hidrogenado de palma (excipiente)

**CARACTERÍSTICAS:**

- Contenido min.: 50 % de materia activa, (expr. en seco).
- Contenido en ácido: 21 % de Ácido Butírico, aprox.
- Contenido calcio: 8,90 % aproximadamente
- Pérdida por desecación: 5 % máx.
- Densidad aparente: 800-900 grs /l, aproximadamente
- pH (solución al 10 %): 8 a 10

**DOSIFICACIÓN RECOMENDADA**

ESPECIE	FASE	DOSIS RECOMENDADA
PORCINO	<b>PRESTARTER</b>	<b>0,75 Kg / Tm</b>
	<b>STARTER</b>	<b>0,75 Kg / Tm</b>
	<b>CRECIMIENTO-ENGORDE</b>	<b>0,50 Kg / Tm</b>
BROILERS	<b>De 0 a 10 días de vida</b>	<b>0,75 Kg / Tm</b>
	<b>De 10 días en adelante</b>	<b>0,50 Kg / Tm</b>
PAVOS	<b>De 0 a 10 días de vida</b>	<b>0,75 - 1 Kg / Tm</b>
	<b>De 10 días en adelante</b>	<b>0,5 - 0,75 Kg / Tm</b>
GALLINAS PONEDORAS	<b>De 0 a 15 días de vida</b>	<b>0,50 Kg / Tm</b>
	<b>De 15 días en adelante</b>	<b>0,50 Kg / Tm</b>
	<b>+ de 35 semanas de vida</b>	<b>0,75 - 1 Kg / Tm</b>
GALLINAS REPRODUCTORAS	<b>De 0 a 15 días de vida</b>	<b>0,50 Kg / Tm</b>
	<b>De 15 días en adelante</b>	<b>0,75 - 1 Kg / Tm</b>

**ENVASES**  
**ALMACENAJE**  
 cada uso.  
**ESTABILIDAD**

**Sacos de 25 Kg. / Big bags de 1000-1250 Kg**  
 Almacenar en sitio fresco y seco, mantener cerrado después de  
**Dos años a partir de la fecha de fabricación.**

**FAMI**qs  
Integrating Feed Additives and Nutritional Quality Systems